

MAGEDREINING


IUKN's
HELSE-
GUIDE



Magedreining er en akutt og livstruende tilstand som kan ramme Irsk Ulvehund. Hunden må umiddelbart behandles av veterinær.

HVA SKJER?


Ved magedreining fylles magesekken med gass og magen vrir seg rundt sin egen akse. Øvre og nedre del av magesekken blir blokkert så ikke gassen kan passere. Blodsirkulasjonen stopper opp, og magesekkveggen begynner å skades. Gjennom denne skadete veggen kommer det giftstoffer fra innholdet i magesekken. Kombinasjonen av dårlig blodsirkulasjon og frigjøring av giftstoffer fra bakterier i magesekken fører til at hunden går i sjokk og dør uten behandling. Risikoen for magedreining øker hvis hunden stresser eller mosjoneres like før eller etter den har spist.



NORMAL

SYMPTOMER

- Rastløshet, pesing, uro
- Klarer ikke legge seg ned
- Gulper/gulper opp skum
- Prøver å kaste opp
- Står med hodet ned
- Oppblåst i magen, spesielt på venstre side
- Ømhet når du tar på magen
- Piper og ser seg bakover
- Bleke slimhinner (feks tannkjøttet)
- Pusteproblemer



BEGYNNENDE

BEHANDLING

Veterinæren vil tømme magesekken for gass ved å føre en tynn sonde ned gjennom spiserøret. Dersom det er helt tett, vil veterinæren punktere magesekken via bukveggen. Når gassen fra magesekken er tømt må hunden opereres. Magesekken dreies tilbake, og tømmes for gassrester, slim osv. Selv om hunden blir raskt behandlet, er det høy risiko forbundet med magedreining. Smerter og nedsatt organfunksjon på grunn av sirkulasjonssvikt til blodkar og organer som nyre og lever, metabolsk acidose, kan ofte gi skader på hjertemuskelen og forårsake forstyrrelser i hjerterytmen.



KRITISK

SKRIV UT!

Gjør alle som har omsorg for hunden kjent med symptomene. På grunn av ulvehundeieiers økte kunnskap om symptomer og tidlig behandling, ser man i dag en markert reduksjon i antall dødsfall knyttet til magedreining.